

F-386 Przygotowanie do badania USG ultrasonograficznego

Ultrasonografia to najpowszechniejsza technika diagnostyki obrazowej. Polega ona na zastosowaniu ultradźwięków w celu uzyskania obrazu przekroju badanego narządu, jest więc jedną z najbezpieczniejszych i najmniej inwazyjnych procedur medycznych, a w związku z tym może być przeprowadzana z praktycznie dowolną częstotliwością, również w czasie ciąży, kiedy to zresztą należy do podstawowych badań kontrolnych. Metoda ta obrazuje tkanki miękkie i pozwala lekarzowi na skuteczne określenie ewentualnych zmian patologicznych.

NA BADANIE NALEŻY PRZYNIEŚĆ

- dokument tożsamości ze zdjęciem;
- skierowanie na badanie;
- poprzednie badania obrazowe (RTG, KT, MR, USG i inne) oraz dokumentację medyczną, w tym wypisy ze szpitali, opisy zabiegów, itp.
- osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG

Rutynowe badanie USG nie wymaga specjalnego przygotowania. Wyjątkiem są jedynie planowe badania jamy brzusznej, które wymagają usunięcia nadmiernej ilości gazów z pętli jelita grubego oraz pełnego pęcherza moczowego.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ

- 24 godziny przed badaniem – należy zachować dietę lekkostrawną (Nie należy spożywać produktów ciężkostrawnych i bogatych w błonnik, sałatek, warzyw, owoców, mięsa i ryb z sosami, kielbasy, mleka, tłuszczów, ciemnego pieczywa, ani pić soków i napojów gazowanych.) Osoby ze skłonnością do wzdęć mogą zażyć np. Espumisan – preparat należy zażyć według ulotki dołączonej do opakowania. Nie należy palić papierosów, nie żuć gumy.
- w dniu badania zgłosić się do pracowni na czczo. Nie wolno palić papierosów, żuć gumy, pić kawy. Jeśli pacjent przyjmuje na stałe leki, w dniu badania powinien przyjąć je zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego popijając niewielką ilością wody niegazowanej.
- w trakcie badania USG wykonywanego przez powłoki brzuszne, pęcherz powinien być wypełniony moczem. Pozwoli to uzyskać pełniejszy obraz narządów. Dlatego na

ok. 1 godzinę przed badaniem wypić 1l wody niegazowanej i w miarę możliwości powstrzymać się od oddawania moczu.